

CAMPOFORT® Fosfamid



HNOJIVO ES

Kapalné dusíkaté NP hnojivo 8-10 s manganem, Mn

8,0 % (v/v) N celkový	vodorozpustný celkový dusík	96 g/l
7,0 % (v/v) N amidický	vodorozpustný močovinný dusík	82 g/l
1,0 % (v/v) N čpavkový	vodorozpustný amonný dusík	14 g/l
10,0 % (v/v) P ₂ O ₅	vodorozpustný oxid fosforečný	120 g/l
0,4 % (v/v) Mn	vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA	5 g/l

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,

Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

Obsah balení: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů)

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **36 měsíců** od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 20 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Fosfamid** se zvýšeným stimulačním účinkem je určeno k podzimní aplikaci do ozimových obilovin. Snižuje citlivost rostlin ke stresovým situacím a podporuje vývoj kořenového systému.

Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

Rozsah a způsob použití: Hektarová dávka: **12 kg / ha** (tj. 10 litrů / ha)

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Nestříkáme porosty přehnojené dusíkem.
5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokořenové výživy rostlin nemůže dostatečně projevit.

Doporučené aplikace listových hnojiv CAMPOFORT® Retafos a Fosfamid

Plodina	Vývojová fáze BBCh (BBA)	Druh listového hnojiva	kombinace s	hektarová dávka hnojiva / optim. množství vody
ozimé obiloviny, tritikale	13 - 22	CAMPOFORT® Fosfamid	herbicidy, fungicidy, insekticidy	12 kg (10 litrů) CF / 120 litrů až 300 litrů
ozimá řepka	14 - 18	CAMPOFORT® Retafos	herbicidy, fungicidy, insekticidy	12 kg (10 litrů) CF / 150 litrů až 300 litrů

Obsah rizikových prvků v hnojivu

nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.

(Cd < 50 mg/kg • Pb < 15 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 150 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.