

## FERTI B

Výrobce: Lovochemie a.s., Tereziánská 57, Lovosice

číslo typu: 6.2 se stopovými živinami

číslo ohlášení: O323

### Chemické a fyzikální vlastnosti:

Znak jakosti	Hodnota
Celkový dusík jako N v %	8,0
Amonný dusík jako N v %	3,0
Močovinový dusík jako N v %	5,0
Fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> v %	10,0
Bór jako B v %	2,0
Molybden jako Mo v %	0,002
Měď jako Cu v %	0,005
Zinek jako Zn v %	0,005
Železo jako Fe v %	0,02
Mangan jako Mn v %	0,01
pH zředěného roztoku (1:5)	6,0–8,0
Hustota v kg/l při 20 °C	cca 1,24

### Obsah rizikových látek:

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg hnojiva, u Cd pak mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) kadmium 50; olovo 15; rtuť 1, arsen 20; chrom 150.

### Použití:

FERTI B se aplikuje ve zředěném stavu závlivkou nebo postřikem a může se používat jak ke hnojení na povrch půdy, tak i k mimokořenové výživě. Je vhodný zejména k rostlinám náročným na fosfor a bor pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem fosforu. Mimokořenová výživa se používá v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení.

### Aplikace:

Plodina	Doba aplikací	Počet aplikací	Dávkování v l/ha
Cukrovka	1. ve fázi 4 – 6 listu 2. postřik před uzavíráním	2	2-5
Řepka olejka	1. ve fázi prodluž. růstu 2. při tvorbě pupat až počátek kvetení	2	2-5
Jádroviny	1. během květu 2. do 3 týdnů po odkvětu 3. po sklizni	3	2
Zelenina	1. 2 týdny po výsadbě, další v intervalu 2 týdnů	3	2
Slunečnice	1. ve fázi 4 listu, další v intervalu min. 3 týdnů do tvorby květu	3	2-5
Kukuřice	1. ve fázi 4 listu, 2. ve fázi 8 listu	2	2-3
Réva vinná	1. 2-3 týdny před květem 2. těsně před květem 3. tvorba bobulí	3	2

Při aplikaci závlivkou doporučujeme koncentraci 20 ml (1 víčko od 5 a 20 l balení) na 4 l vody. Připraveným roztokem zalévat půdu s plodinami 1x za 14 dnů.

**Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):**

**Výstražné symboly nebezpečnosti:**



**Signální slovo:**

Nebezpečí.

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P281 - Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

**Nebezpečné složky:**

Obsahuje kyselina boritou  $H_3BO_3$  a tetraboritan sodný  $Na_2B_4O_7$ .

Zpětný odběr prázdných obalů zajišťuje firma EKO- KOM, a.s. Praha.

**Doprava a skladování:**

Hnojivo se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem. Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech. Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod  $+ 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností  $\pm 3\%$ .

**Objem balení:** 0,5, 1, 5, 10, 20, 600, 1000 litrů a cisterny

**Doba použitelnosti:** min. 24 měsíců při skladování v původních obalech

**Datum výroby:**