

HYCOL Z

Výrobce: SG spol. s r.o., Nám. Míru 65, Zlín

číslo rozhodnutí o registraci: **0827**

Chemické a fyzikální vlastnosti:

| Chemická a fyzikální vlastnost | hodnota | |
|---|---------|--------|
| Celkový dusík v původním vzorku jako N v % | min. | 5,0 |
| Sušina v % | min. | 35,0 |
| Popel v % | max. | 8,5 |
| Aminokyseliny v původním vzorku celkem v g/kg | min. | 200 |
| Bór jako B v % | | 0,03 |
| Molybden jako Mo v % | | 0,002 |
| Železo jako Fe v % | | 0,12 |
| Mangan jako Mn v % | | 0,08 |
| Měď jako Cu v % | | 0,02 |
| Zinek jako Zn v % | | 0,032 |
| Hodnota pH | od 5,2 | do 6,0 |

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití

Hycol Z je kapalný přípravek zejména pro foliární výživu zeleniny, okrasných rostlin, dále pro travníky, pokojové rostliny. Jeho účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky (mikroelementy) a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů, zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích.

Používá se ve formě 0,1 – 0,3 % roztoku (10 – 30 ml Hycol Z do 10 l vody v postřikovači) Vhodná je opakovaná aplikace během vegetace po 3 týdnech. Výhodná je společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobcí. Aplikace provádějte v ranních a večerních hodinách. Neředit přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikční nádoby po práci dobře propláchněte vodou.

- doporučená dávka hnojiva je 3 – 5 l/ha ve formě 0,1 – 0,3 %
- nejvhodnější doba aplikace závisí na velikosti listové plochy a intenzitě růstu.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pracujte v rukavicích. Při práci je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc

Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování

Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrazení a rozmrazení nemá vliv na původní vlastnosti.

Čisté odpadní obaly – polyethylenové nádoby – předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně komunálního odpadu.

Hmotnost **0,5l, 1l, 5l, 10l, 50l, 100l, 400l, 600l, 1 000l**

Doba použitelnosti: **minimálně tři roky od data výroby při skladování v původních obalech**

Datum výroby/číslo výrobní šarže.